Fiche d'information destinée aux patient·e·s :

Traitement par sulfasalazine

Qu'est-ce que la sulfasalazine, et comment agit-elle ?

La sulfasalazine est un anti-inflammatoire utilisé dans le traitement des maladies inflammatoires rhumatismales et des maladies inflammatoires de l'intestin. Elle réduit l'inflammation et, avec elle, les douleurs et les gonflements articulaires, la raideur matinale et la fatigue.

Comment se déroule le traitement par sulfasalazine ?

La sulfasalazine se présente sous forme de comprimés de 500 mg. La dose est lentement augmentée pour que vous tolériez mieux le médicament. Il peut parfois aussi être judicieux de prendre directement deux fois deux comprimés.

Prise	Matin	Soir
1ère semaine : chaque jour		1
2e semaine : chaque jour	1	1
3e semaine : chaque jour	2	1
à partir de la 4e semaine : chaque jour	2	2

Le traitement par sulfasalazine se fait sur le long terme, son effet dépend d'un emploi régulier. Le traitement se poursuit même si vous allez mieux. En effet, en cas d'arrêt précoce, la maladie pourrait s'aggraver à nouveau.

Quand le médicament agit-il ?

La plupart des patient·e·s remarquent une amélioration au bout de 12 à 16 semaines. En cas d'effet insuffisant, votre médecin décidera avec vous d'augmenter la dose ou de modifier le traitement.

Des effets secondaires sont-ils possibles ?

Chaque traitement efficace, y compris la sulfasalazine, est susceptible d'occasionner des effets indésirables. La plupart des effets secondaires listés sur la notice d'emballage sont rares et sans danger. Ils ne vous contraindront pas à arrêter le traitement.

Des nausées, des vomissements, des diarrhées et des maux de ventre sont possibles. Des maux de tête, des vertiges ou une fatigue inhabituelle ont également été observés. Ces symptômes apparaissent surtout durant les premières semaines du traitement. Certaines personnes ont des démangeaisons, des éruptions cutanées ou des inflammations de la muqueuse buccale. Informez votre médecin de tout effet secondaire. **Si vous avez une fièvre inexpliquée, une détresse respiratoire ou des inflammations de la muqueuse buccale, consultez immédiatement un·e médecin !**

A quelle fréquence ont lieu les contrôles ?

le 1er mois	au bout de 2 à 4 semaines
le 2e et le 3e mois	toutes les 4 semaines
à partir du 4e mois	toutes les 12 semaines

Dans certains cas, on peut renoncer aux contrôles au bout de 3 à 6 mois.

Que faire si vous avez oublié de prendre un comprimé ?

Prenez le prochain comprimé dès que possible, à la dose prévue. N'essayez pas de rattraper la dose manquée.

Quel est l'impact de la sulfasalazine sur la fertilité ?
La sulfasalazine ne diminue pas la fertilité de la femme. Vous pouvez poursuivre le traitement avant une grossesse planifiée. En prévention, on recommande toutefois d'augmenter la dose d'acide folique (voir ci-dessous, dans la section « Grossesse »).

Chez l'homme, la sulfasalazine peut diminuer transitoirement la capacité à procréer (réversible). Le plaisir sexuel n'est pas affecté. Si vous souhaitez avoir un enfant, vous devrez arrêter la sulfasalazine après en avoir discuté avec votre médecin. Vous retrouverez votre entière capacité à procréer au bout de 3 mois.

La sulfasalazine peut-elle être utilisée pendant la grossesse et l'allaitement ?
La sulfasalazine peut être utilisée pendant la grossesse. Etant donné qu'elle diminue potentiellement l'absorption de l'acide folique, il serait bon d'augmenter votre supplémentation en acide folique avant de tomber enceinte, et de la poursuivre pendant toute la grossesse (p. ex. 1 mg par jour). Il est possible d'allaiter sous sulfasalazine.

A quoi d'autre devez-vous prêter attention pendant le traitement par sulfasalazine ?
Evitez les expositions intensives aux rayons du soleil.

Comment conserver et stocker la sulfasalazine ?
A température ambiante.

A quoi devez-vous prêter attention si vous prenez d'autres médicaments en même temps que la sulfasalazine ?
Informez votre médecin de tous les autres médicaments que vous prenez.

Vous avez d'autres questions ?
Votre médecin y répondra volontiers.

La Ligue suisse contre le rhumatisme est la référence en matière de rhumatisme. Consultez son site Internet pour découvrir ses nombreuses offres et obtenir des informations sur votre maladie et son traitement : www.ligues-rhumatisme.ch | 044 487 40 00 | info@rheumaliga.ch