Informazioni per le pazienti e i pazienti:

Trattamento con sulfasalazina

Che cos'è la sulfasalazina e come agisce questo farmaco?
La sulfasalazina è un farmaco antinfiammatorio che viene impiegato in caso di malattie reumatiche infiammatorie e malattie infiammatorie intestinali. Riducendo l'infiammazione si attenuano anche dolori e gonfiori articolari, rigidità mattutina e stanchezza.

Come viene effettuato il trattamento con sulfasalazina?
La sulfasalazina è disponibile in compresse da 500 mg. Per una migliore tollerabilità del farmaco la dose viene aumentata gradualmente. Tuttavia, a volte, può essere opportuno assumere fin dall'inizio 2 compresse 2 volte al giorno.

Assunzione	mattino	sera
1ª settimana tutti i giorni		1
2ª settimana tutti i giorni	1	1
3ª settimana tutti i giorni	2	1
dalla 4ª settimana tutti i giorni	2	2

La sulfasalazina deve essere assunta a lungo termine. Il farmaco è efficace solo se si assumono le compresse regolarmente. Il trattamento deve essere continuato anche se ci si sente meglio, altrimenti la malattia può peggiorare di nuovo.

Quando insorge l'effetto?
La maggior parte di pazienti avverte un miglioramento entro 12-16 settimane. Se l'effetto non è sufficiente la sua medica o il suo medico deciderà insieme a lei se aumentare la dose o modificare la terapia.

Possono manifestarsi effetti collaterali?
Come per ogni trattamento efficace, anche con la sulfasalazina possono manifestarsi effetti indesiderati. Tuttavia, la maggior parte degli effetti collaterali menzionati nel foglietto illustrativo è rara e non pericolosa e quindi non comporta la necessità di interrompere la terapia.

Possono manifestarsi nausea, vomito, diarrea e dolori addominali. Sono stati osservati anche sintomi quali mal di testa, vertigini o stanchezza inusuale. Questi disturbi compaiono soprattutto nelle prime settimane del trattamento. A volte insorgono prurito, eruzione cutanea o infiammazione della mucosa orale. Informi la sua medica o il suo medico se nota effetti collaterali. **Chieda subito una consulenza medica in caso di febbre non chiara, respiro affannoso e infiammazioni della mucosa orale.**

Con quale frequenza devono essere effettuati gli esami di controllo?

nel 1° mese:	dopo 2-4 settimane
nel 2° e nel 3° mese:	ogni 4 settimane
dal 4° mese:	ogni 12 settimane

Dopo 3-6 mesi, in alcuni casi, si può rinunciare a effettuare gli esami di controllo.

Che cosa succede se ha dimenticato una compressa?
Deve assumere appena possibile la dose successiva prevista, senza recuperare la compressa dimenticata.

Che effetto ha la sulfasalazina sulla fertilità?
Nelle donne la sulfasalazina non riduce la fertilità. Non è necessario sospendere la terapia prima di una gravidanza programmata. Tuttavia, come prevenzione, è raccomandata l'assunzione di una dose maggiore di acido folico (vedere in basso, sotto gravidanza).

Negli uomini la sulfasalazina può compromettere temporaneamente la capacità riproduttiva. Tuttavia, non influisce sulla sensibilità sessuale. Gli uomini che desiderano avere figli devono interrompere la sulfasalazina previa consultazione medica. La capacità riproduttiva torna a essere quella di prima entro 3 mesi.

Si può usare la sulfasalazina durante la gravidanza e l'allattamento?
La sulfasalazina può essere usata durante la gravidanza. Il farmaco tuttavia riduce l'assorbimento di acido folico ed è quindi raccomandata l'assunzione di una supplementazione di acido folico a dose leggermente più elevata già prima del previsto concepimento e per tutto il periodo della gravidanza (ad es. 1 mg al giorno). La sulfasalazina può essere assunta durante l'allattamento.

A cos'altro si deve prestare attenzione durante il trattamento con sulfasalazina?
Eviti l'esposizione alla luce solare intensa.

Come va conservata la sulfasalazina?
A temperatura ambiente.

A cosa si deve prestare attenzione quando si combina la sulfasalazina con altri farmaci?
Informi la sua medica o il suo medico in merito a tutti gli altri farmaci che assume.

Ha altre domande?
In questo caso si rivolga alla sua medica o al suo medico curante.

Ulteriori informazioni sulla malattia, sul suo trattamento e su molte offerte di servizi sono disponibili presso la Lega svizzera contro il reumatismo, il punto di contatto per persone affette da reumatismi:
www.reumatismo.ch | 044 487 40 00 | info@rheumaliga.ch