Informazioni per le pazienti e i pazienti

Trattamento con azatioprina

Che cos'è l'azatioprina e come agisce questo farmaco?

L'azatioprina è un farmaco immunosoppressore appartenente al gruppo dei farmaci di fondo sintetici convenzionali. Inibisce la proliferazione dei linfociti (specifiche cellule di difesa del sistema immunitario) interferendo con la formazione e il metabolismo dei nucleosidi. I nucleosidi sono i piccoli elementi costitutivi che compongono il nostro materiale genetico (DNA e RNA).

Come viene effettuato il trattamento con azatioprina?

L'azatioprina viene assunta sotto forma di compresse da 2 a 3 volte al giorno.

Dose: __ compresse di azatioprina da __ mg al giorno.

Il trattamento con azatioprina deve essere a lungo termine ed è efficace solo se assunto regolarmente. La terapia deve essere continuata anche se ci si sente meglio, altrimenti la malattia può peggiorare di nuovo.

Quando insorge l'effetto?

La maggior parte delle/dei pazienti avverte un miglioramento dopo 4-8 settimane, anche se in alcuni casi possono essere necessari fino a 6 mesi prima che insorga l'effetto. Se l'effetto non è sufficiente, la sua o il suo medico deciderà se aumentare la dose o modificare la terapia.

Dopo alcune settimane, il dolore e il gonfiore regrediscono e la rigidità mattutina e la stanchezza si attenuano. La capacità fisica aumenta. Spesso migliorano anche i parametri dell'infiammazione nel sangue, ad es. la velocità di eritrosedimentazione.

L'efficacia della terapia con azatioprina può essere valutata definitivamente solo dopo 6 mesi. Se l'efficacia non è sufficiente, si deve cambiare la terapia.

Possono manifestarsi effetti collaterali?

Come per ogni trattamento, anche con l'azatioprina possono manifestarsi effetti indesiderati. Pertanto, è necessario un controllo regolare da parte della sua o del suo medico di famiglia, che può riconoscere tempestivamente eventuali effetti collaterali e adottare le misure necessarie. Gli effetti collaterali di solito regrediscono. La maggior parte degli effetti collaterali menzionati nel foglietto illustrativo è rara. Non tutti gli effetti collaterali costringono a interrompere la terapia.

Non di rado si manifestano nausea, vomito, diarrea e perdita di peso. Se nota uno di questi effetti collaterali, deve informare la sua o il suo medico al più tardi in occasione del prossimo esame. In caso di febbre deve sottoporsi immediatamente a cure mediche.

Quali effetti collaterali rileva la sua o il suo medico?

La o il medico esamina se vi sono alterazioni della pelle e delle mucose. Mediante esami del sangue può inoltre individuare alterazioni del fegato, dei reni e dell'ematopoiesi. È necessario anche un esame delle urine.

Con quale frequenza devono essere effettuati gli esami di controllo?

Nei primi 2 mesi:	Successivamente:
ogni 1-2 settimane	ogni 4-12 settimane

Informi immediatamente la sua o il suo medico di famiglia se nota disturbi insoliti durante il trattamento con azatioprina.

Che effetto ha l'azatioprina sulla fertilità?

L'azatioprina non ha finora mostrato alcun effetto negativo sulla fertilità di donne o uomini.

Si può usare l’azatioprina durante la gravidanza e l’allattamento?
In caso di necessità, dopo aver consultato la sua o il suo medico curante, il trattamento con azatioprina può essere continuato anche durante la gravidanza e l’allattamento.

A cos’altro si deve prestare attenzione durante il trattamento con azatioprina?
Anche durante il trattamento con azatioprina si possono effettuare tutte le vaccinazioni raccomandate previa consultazione medica. Devono essere invece evitate le vaccinazioni con vaccini vivi.

Come va conservata e trasportata l’azatioprina?
Non vi sono in proposito raccomandazioni o misure precauzionali particolari.

A cosa si deve prestare attenzione quando si combina l’azatioprina con altri farmaci?
Informi la sua o il suo medico di tutti i farmaci che sta assumendo. È necessario prestare particolare attenzione ai farmaci contro l’iperuricemia contenenti allopurinolo o febuxostat. Questi farmaci includono Zyloric®, Bleminol®, Cellidrin®, Epidropal®, Foligan®, Remid®, Allo-Puren® e Adenuric®. **Se le sono stati prescritti allopurinolo o febuxostat, prima dell’assunzione consulti assolutamente la sua o il suo reumatologo!**

Ha altre domande?
In questo caso si rivolga alla sua o al suo medico curante.

Ulteriori informazioni sulla malattia, sul suo trattamento e su molte offerte di servizi sono disponibili presso la Lega svizzera contro il reumatismo, il punto di contatto per persone affette da reumatismi:
www.reumatismo.ch | 044 487 40 00 | info@rheumaliga.ch