Informazioni per le pazienti e i pazienti

Trattamento con abatacept

Che cos'è l'abatacept e come agisce questo farmaco?L'abatacept è un farmaco del gruppo dei cosiddetti farmaci biologici. Si tratta di farmaci prodotti mediante processi biotecnologici che influenzano le reazioni immunitarie nelle malattie reumatiche. I farmaci biologici non sono disponibili in compresse, ma possono essere somministrati solo sotto forma di iniezioni o infusioni.

I linfociti T (globuli bianchi specializzati) svolgono un ruolo importante nei processi infiammatori. L'abatacept inibisce l'attività dei linfociti T, riducendo così il dolore, il gonfiore e la progressione della malattia.

L'abatacept è omologato per il trattamento dell'artrite reumatoide, se la precedente terapia di fondo, incluso il metotrexato (MTX), ha mostrato un'efficacia insufficiente.

Come viene effettuato il trattamento con abatacept?
L'abatacept viene iniettato sotto la pelle con una siringa preriempita (SP) o con un iniettore a penna. La dose è di 125 mg una volta alla settimana. Dopo aver ricevuto istruzioni sulla tecnica di iniezione, dietro consenso medico può iniettarsi autonomamente l'abatacept. Il sito di iniezione deve essere cambiato ogni settimana. L'abatacept può essere somministrato anche come infusione (nell'arco di oltre 30 minuti) in una dose adeguata al peso corporeo ogni 4 settimane. In genere l'abatacept è utilizzato in combinazione con il metotrexato (MTX).

Il trattamento con abatacept deve essere a lungo termine ed è efficace solo se somministrato regolarmente. La terapia deve essere continuata anche se ci si sente meglio, altrimenti la malattia può peggiorare di nuovo.

Quando insorge l'effetto?
L'effetto della terapia può insorgere già dopo le prime somministrazioni. Tuttavia, possono essere necessari anche 3 (a volte fino a 6) mesi prima che avverta un effetto significativo.

Possono manifestarsi effetti collaterali?
Come per ogni trattamento, anche con l'abatacept possono manifestarsi effetti indesiderati. La maggior parte degli effetti collaterali menzionati nel foglietto illustrativo è molto rara. Durante o poco dopo la somministrazione può insorgere una reazione acuta, solitamente lieve e caratterizzata da sintomi simil-influenzali. Possono manifestarsi eruzione cutanea, prurito, nausea, vomito, cefalea, febbre, brividi e lieve aumento o diminuzione della pressione arteriosa.
Se questo farmaco viene somministrato per infusione, durante l'infusione e dopo un'ora dal suo termine sarà eseguito un attento monitoraggio. Un'ora dopo il completamento della somministrazione di abatacept gli effetti collaterali sono rari.

Esiste un rischio lievemente aumentato di infezioni, in particolare delle vie respiratorie e delle vie urinarie.

In caso di febbre e infezioni è importante che chieda alla sua o al suo medico se può continuare la terapia con abatacept. In caso di infezioni gravi accompagnate da febbre o herpes zoster non deve esserle somministrato l'abatacept. In caso di dubbi, contatti la sua o il suo medico!

Con quale frequenza devono essere effettuati gli esami di controllo?
Ogni 3-6 mesi.

Che effetto ha l'abatacept sulla fertilità?
L'abatacept non ha alcun effetto negativo sulla fertilità di donne e uomini.

Si può usare l'abatacept durante la gravidanza e l'allattamento?
Se necessario, l'abatacept può essere usato per controllare efficacemente la malattia della madre durante la gravidanza. La terapia con abatacept è compatibile con l'allattamento al seno.

A cos’altro si deve prestare attenzione durante il trattamento con abatacept?
Finora non è stato riportato alcun aumento del numero di casi di tubercolosi in pazienti in trattamento con abatacept. Nonostante ciò, prima di iniziare il trattamento, sarà necessaria una visita medica per verificare l’eventuale presenza di segni e sintomi di una pregressa tubercolosi. Se si riscontrano segni di una tubercolosi non completamente guarita, deve essere effettuata una profilassi antitubercolare con un farmaco appropriato (isoniazide in combinazione con vitamina B_6). La profilassi inizia 4 settimane prima della prima somministrazione di abatacept e dura 9 mesi.

Durante la terapia e nei primi tre mesi dopo l’ultima dose di abatacept si devono evitare vaccinazioni con vaccini vivi. Le vaccinazioni con vaccini inattivati (ad es. la vaccinazione antinfluenzale) sono invece sicure e opportune.

Informi la sua o il suo medico in merito a tutti gli altri farmaci che assume. Se sta assumendo anche altri farmaci antireumatici, i loro possibili effetti collaterali devono continuare a essere considerati.

Informi la sua o il suo medico se si deve sottoporre a un intervento chirurgico maggiore. In tal caso si deve valutare individualmente un’eventuale sospensione della terapia.

Come va conservato l’abatacept?
Conservare a una temperatura di 2-8 °C (in frigorifero) e non congelare.

A cosa si deve prestare attenzione quando si combina l’abatacept con altri farmaci?
Non sono note interazioni dell’abatacept con altri farmaci. Se riceve l’abatacept in combinazione con il metotrexato (MTX) o con un altro farmaco di fondo, saranno continuati i relativi controlli. L’abatacept non deve essere somministrato in concomitanza con altri farmaci biologici, ad es. gli inibitori del TNF. Informi la sua o il suo medico o la sua o il suo farmacista se sta assumendo o ha assunto di recente altri farmaci. Ciò vale anche per i farmaci non soggetti a prescrizione medica.

Ha altre domande?
In questo caso si rivolga alla sua o al suo medico curante.

Ulteriori informazioni sulla malattia, sul suo trattamento e su molte offerte di servizi sono disponibili presso la Lega svizzera contro il reumatismo, il punto di contatto per persone affette da reumatismi:
www.reumatismo.ch | 044 487 40 00 | info@rheumaliga.ch